



## Simulation of Rice Leaf Area, Yield and Nitrogen Amount at Different Management of Nitrogen by ORYZA2000 Model

Elham Modiri<sup>1</sup> | Davood Barari Tari<sup>2</sup> | Ebrahim Amiri<sup>3</sup> | Yousef Niknejad<sup>4</sup> | Hormoz Fallah Amoli<sup>5</sup>

1. Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran. E-mail: Elham.Modiri@iau.ac.ir
2. Corresponding Author, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran. E-mail: Davood.Barari@iau.ac.ir
3. Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. E-mail: Ebrahim.Amiri@iau.ac.ir
4. Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran. E-mail: Yousef.Niknejad@iau.ac.ir
5. Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran. E-mail: Hormoz.Falah@iau.ac.ir

### Article Info

**Article type:**  
Research Article

### Article history:

Received 18 May 2022  
Received in revised form  
Accepted  
Published online

### Keywords:

Leaf area  
Simulation  
Splitting of nitrogen fertilization  
Validation  
Yield

### ABSTRACT

**Objective:** In order to simulate yield, leaf area, and nitrogen amount in rice using the ORYZA2000 model under different nitrogen fertilization amounts and splitting, an experiment was carried out at a research farm located in Mazandaran Province (Babol) during 2017-18 based on a factorial in a randomized complete block design with three replications.

**Methods:** The factors were amount of nitrogen in four rates (50, 90, 130, and 170 Kg n ha<sup>-1</sup>, in urea form) and nitrogen splitting were at four levels (T<sub>1</sub>: 70% basal + 30% in tillering stage; T<sub>2</sub>: 33.33% basal + 33.33% in tillering stage + 33.33% in panicle initiation stage; T<sub>3</sub>: 25% basal + 50% in tillering stage + 25% in panicle initiation stage; T<sub>4</sub>: 25% basal + 25% in tillering stage + 50% in panicle initiation stage).

**Results:** By RMSEn four, four, nine, and six percent in calibration and five, four, four, and eight percent in validation, the model successfully simulated respectively grain yield, biomass, grain nitrogen, and total nitrogen. The calibration and validation of the model showed that the mean square error for the leaf area index was 0.5 and 0.4, respectively.

**Conclusion:** Based on the results obtained, the ORYZA2000 model can be used to select the best nitrogen fertilizer management strategy in rice-rich areas of northern Iran.

**Cite this article:** Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. *Journal of Crops Improvement*, 25 (4), 839-845. DOI:



© The Authors.  
DOI:

Publisher: The University of Tehran Press.

## شبیه‌سازی سطح برگ، عملکرد و مقدار نیتروژن برنج در مدیریت مختلف مصرف نیتروژن با استفاده از مدل ORYZA2000

الهام مدیری<sup>۱</sup> | داود براری تباری<sup>۲</sup> | ابراهیم امیری<sup>۳</sup> | یوسف نیک نژاد<sup>۴</sup> | هرمز فلاح آملی<sup>۵</sup>

۱. گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، واحد آیت ... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. رایانامه: Elham.Modiri@iau.ac.ir
۲. نویسنده مسئول، گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، واحد آیت ... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. رایانامه: Davood.Barari@iau.ac.ir
۳. گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. رایانامه: Ebrahim.Amiri@iau.ac.ir
۴. گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، واحد آیت ... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. رایانامه: Yousef.Niknejad@iau.ac.ir
۵. گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، واحد آیت ... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. رایانامه: Hormoz.Falah@iau.ac.ir

## اطلاعات مقاله

## چکیده

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

**هدف:** به منظور شبیه‌سازی عملکرد، سطح برگ و مقدار نیتروژن گیاه برنج با استفاده از مدل ORYZA2000 در مقادیر مختلف کود نیتروژنه و شیوه‌های متفاوت تقسیم کود، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی واقع در استان مازندران (بابل) طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.

**روش پژوهش:** عامل اول شامل چهار سطح کود نیتروژنه (۵۰، ۹۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار، از منبع اوره) و عامل دوم شیوه‌های متفاوت تقسیم کود (T<sub>1</sub>: ۷۰ درصد پایه + ۳۰ درصد پنجه‌زنی، T<sub>2</sub>: ۳۳/۳۳ درصد پایه + ۳۳/۳۳ درصد پنجه‌زنی + ۳۳/۳۳ درصد ظهور خوشه آغازین، T<sub>3</sub>: ۲۵ درصد پایه + ۵۰ درصد پنجه‌زنی + ۲۵ درصد ظهور خوشه آغازین، T<sub>4</sub>: ۲۵ درصد پایه + ۲۵ درصد پنجه‌زنی + ۵۰ درصد ظهور خوشه آغازین) بودند.

**یافته‌ها:** نتایج نشان داد که مدل، عملکرد دانه، زیست‌توده، نیتروژن دانه و نیتروژن کل (مجموع دانه، ساقه و برگ) را به ترتیب باریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده چهار، چهار، نه و شش درصد در مرحله کالیبراسیون و پنج، چهار، چهار و هشت درصد در مرحله اعتبارسنجی به خوبی شبیه‌سازی نمود. میانگین مربعات خطا برای شاخص سطح برگ به میزان ۰/۵ و ۰/۴ به ترتیب در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل مشاهده شد.

**نتیجه‌گیری:** با توجه به نتایج به دست آمده مدل ORYZA2000 می‌تواند به عنوان یک مدل شبیه‌سازی مطلوب برای انتخاب مناسب‌ترین استراتژی جهت بهبود عملکرد برنج در مدیریت مختلف کود نیتروژن در مناطق برنج‌خیز شمال کشور استفاده شود.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

تاریخ بازنگری:

تاریخ پذیرش:

تاریخ انتشار:

کلیدواژه‌ها:

اعتبارسنجی

تقسیم کود نیتروژن

سطح برگ

شبیه‌سازی

عملکرد

استناد: نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله. *بزرگراه کشاورزی*، ۲۵ (۴)، ۸۳۹-۸۴۵. DOI: 10.22034/BJAAS.1401.02.28.01



© نویسندگان

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

## ۱. مقدمه

برنج (*Oryza sativa L.*) نقش حیاتی در امنیت غذایی بیش از نیمی از جمعیت جهان را دارد (گوتاکر<sup>۱</sup> و همکاران، ۲۰۲۰). در ایران این گیاه به عنوان دومین غذای اصلی با سطح زیر کشت حدود ۶۳۷ هزار هکتار که بیش از ۷۰ درصد سطح زیر کشت آن در استان‌های شمالی مازندران، گیلان و گلستان است شناخته می‌شود (وزارت کشاورزی<sup>۲</sup>، ۲۰۲۲). با توجه به نقش برنج در سبد غذایی مردم جهان از جمله ایران، توجه به فاکتورهای مؤثر در جهت افزایش تولید این محصول بسیار حائز اهمیت است.

مدیریت مصرف عناصر ضروری از جمله مهم‌ترین عواملی است که باعث بهبود عملکرد گیاه برنج می‌گردد. با توجه به نقش ویژه نیتروژن بین عناصر غذایی در این گیاه، تعیین بهترین میزان و نحوه مصرف این عنصر ضروری است. استفاده از کود نیتروژن در زمان و به مقدار مناسب سبب افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاه برنج، مقاومت در برابر آفات، تجمع ماده خشک، ارتقا جذب مواد غذایی شده و در نتیجه به افزایش عملکرد دانه کمک می‌کند (ژائو و همکاران<sup>۳</sup>، ۲۰۲۰). بیشتر مطالعاتی که در زمینه نیتروژن در گیاه برنج صورت پذیرفته بر روی کارایی مصرف، تأثیر بر عملکرد و اجزای عملکرد متمرکز شده است (اقبال<sup>۴</sup> و همکاران، ۲۰۱۴؛ امیری<sup>۵</sup> و همکاران، ۲۰۱۴). تعیین مقدار مطلوب استفاده از نهاده‌های کشاورزی مانند آب و کود و یا به عبارتی حرکت به سمت کشاورزی پایدار به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی مدیریت کشاورزی نیازمند تحقیقات گسترده بوده که استفاده از مدل‌های رشد برای محصولات کشاورزی یکی از رویکردهای مؤثر برای دستیابی به این هدف است.

مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل سامانه‌های گیاهی به ابزار مهمی در تحقیقات کشاورزی مدرن تبدیل شده‌اند و یکی از روش‌های نوین و مناسب جهت برآورد نیاز تغذیه‌ای گیاهان است. مدل فرایندهای فیزیولوژیکی و اکولوژیکی گیاه را در معادلات ریاضی ترکیب می‌کند. شکافی که بین نتایج حاصل از شبیه‌سازی به‌وسیله کاربرد مدل‌ها و همچنین داده‌های محاسبه‌شده واقعی حاصل می‌شود کارایی و اعتبار آن مدل را نشان می‌دهد.

## ۲. پیشینه پژوهش

مدل‌های گیاهی مختلفی از قبیل APSIM-ORYZA، Infocrop، CERES-Rice، CropSyst، ORYZA2000، AquaCrop برای شبیه‌سازی گیاه برنج وجود دارند (آرتاچو<sup>۶</sup> و همکاران، ۲۰۱۱). این مدل‌ها برای مطالعه طیف گسترده‌ای از موارد مانند کشت مخلوط، پتانسیل تولید، شیوه‌های مدیریت جایگزین، پیش‌بینی عملکرد و ارزیابی اثر تغییر اقلیم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدل ORYZA2000 یکی از مدل‌های شبیه‌سازی گیاه برنج که به‌عنوان یک پروژه مشترک در زمینه تجزیه و تحلیل کمی سامانه رشد گیاه برنج توسط دانشگاه واخنینگن هلند<sup>۷</sup> و موسسه بین‌المللی تحقیقات برنج<sup>۸</sup> معرفی شد و از یک طرح محاسباتی روزانه برای میزان تولید ماده خشک اندام‌های گیاهی و نرخ رشد فنولوژیکی

<sup>1</sup> Gutaker

<sup>2</sup> Agricultural Ministry

<sup>3</sup> Zhao

<sup>4</sup> Iqbal

<sup>5</sup> Amiri

<sup>6</sup> Artacho

<sup>7</sup> Wageningen University

<sup>8</sup> International Rice Research Institute

پیروی می‌کند (بومن<sup>۱</sup> و همکاران، ۲۰۰۱). مدل ORYZA2000 توسط محققین مختلفی در گیاه برنج مورد ارزیابی قرار گرفت که در اکثر موارد نتایج رضایت‌بخشی از شبیه‌سازی فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی را گزارش نمودند (لی<sup>۲</sup> و همکاران، ۲۰۱۳؛ امیری<sup>۳</sup> و همکاران، ۲۰۱۴؛ ژانگ<sup>۴</sup> و همکاران، ۲۰۱۵؛ کائو<sup>۵</sup> و همکاران، ۲۰۱۷؛ ماجومدر<sup>۶</sup> و داس<sup>۷</sup>؛ ۲۰۱۸). امیری<sup>۸</sup> و همکاران (۲۰۱۴) در مورد سه مدل ORYZA2000، CERES-Rice و AquaCrop گزارش نمودند که مدل ORYZA2000 عملکرد دانه و عملکرد زیست‌توده را با دقت پایین‌تری نسبت به مدل CERES-Rice و AquaCrop شبیه‌سازی نمود درحالی‌که در تحقیق دیگری مدل ORYZA2000 ضمن شبیه‌سازی مطلوب عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی توانست نیتروژن دانه و نیتروژن کل گیاه را با  $RMSE_n$  به ترتیب نه و ۱۲ درصد شبیه‌سازی نماید (لیمودهی<sup>۹</sup> و همکاران، ۲۰۱۴).

تجزیه و تحلیل کمی نیتروژن با روش‌های شبیه‌سازی در برنج به‌ویژه استفاده از مدل ORYZA2000 تحت شرایط مختلف مدیریت مصرف نیتروژن در مناطق برنج‌خیز شمال ایران به میزان محدودی صورت پذیرفته است. بنابراین تحقیق حاضر باهدف کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل ORYZA2000 در میزان و شیوه مختلف مصرف نیتروژن با داده‌های تجربی در زمین‌های زراعی شمال ایران (مازندران) صورت پذیرفت.

---

<sup>1</sup> Bouman

<sup>2</sup> Li

<sup>3</sup> Amiri

<sup>4</sup> Zhang

<sup>5</sup> Cao

<sup>6</sup> Majumder

<sup>7</sup> Das

<sup>8</sup> Amiri

<sup>9</sup> Limoudehi

### ۳. روش‌شناسی پژوهش

به‌منظور واسنجی و اعتبارسنجی مدل ORYZA2000، آزمایشی در سال‌های زراعی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در مزرعه تحقیقاتی زراعت کشت در استان مازندران (بابل) واقع در عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۲۸ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۲ درجه و ۲۳ دقیقه شرقی و ارتفاع محل از سطح دریا ۲۹/۸ متر به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل مقادیر مصرف کود نیتروژن از منبع کود اوره در چهار سطح (۵۰، ۹۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ کیلوگرم اوره در هکتار) و فاکتور دوم شامل شیوه تقسیط کود در چهار سطح (T<sub>1</sub>: ۷۰ درصد پایه + ۳۰ درصد پنجه‌زنی، T<sub>2</sub>: ۳۳/۳۳ درصد پایه + ۳۳/۳۳ درصد پنجه‌زنی + ۳۳/۳۳ درصد ظهور خوشه آغازین، T<sub>3</sub>: ۲۵ درصد پایه + ۵۰ درصد پنجه‌زنی + ۲۵ درصد ظهور خوشه آغازین، T<sub>4</sub>: ۲۵ درصد پایه + ۲۵ درصد پنجه‌زنی + ۵۰ درصد ظهور خوشه آغازین) در نظر گرفته شد. بر اساس آمار هواشناسی ده‌ساله، منطقه مورد آزمایش دارای میانگین بارندگی سالیانه برابر ۷۲۴/۵ میلی‌متر، میانگین بیشینه دما برابر با ۲۶/۶ درجه سانتی‌گراد، میانگین کمینه دما برابر ۱۷/۴ درجه سانتی‌گراد و میانگین رطوبت نسبی سالانه برابر ۷۹ درصد و تعداد روزهای بارانی برابر با ۱۱۵ روز می‌باشد. خصوصیات خاک و همچنین آب‌وهوای منطقه در طول اجرای آزمایش در جدول‌های یک و دو نشان داده شد. برای کالیبراسیون از داده‌های سال ۱۳۹۶ و جهت اعتبارسنجی از داده‌های سال ۱۳۹۷ استفاده گردید.

جدول ۱. مشخصات خاک مزرعه آزمایشی در سال‌های زراعی انجام آزمایش

سال زراعی	بافت	PH	رس (درصد)	سیلت (درصد)	شن (درصد)	پتاسیم قابل جذب (میلی‌گرم در کیلوگرم)	فسفر قابل جذب (میلی‌گرم در کیلوگرم)	نیتروژن خاک (درصد)
۱۳۹۶	لوم	۶/۲۱	۲۱	۴۴	۳۵	۱۴۷	۱۷	۱/۳۲
۱۳۹۷	لوم	۶/۳۷	۲۷	۴۳	۳۰	۱۴۳	۱۲	۱/۳۷

جدول ۲. پارامترهای آب و هوایی منطقه مورد آزمایش در سال‌های زراعی انجام آزمایش

سال زراعی	متوسط سرعت باد (کیلومتر بر ساعت)	متوسط بارندگی (میلی‌متر)	حداکثر دمای روزانه (درجه سانتی‌گراد)	حداقل دما روزانه (درجه سانتی‌گراد)	متوسط ساعات آفتابی (ساعت در روز)
۱۳۹۶	۲/۱	-/۳	۲۰/۹	۹/۷	۴/۹
۱۳۹۷	۱/۵	-/۴	۲۱/۹	۸/۸	۵/۱
۱۳۹۶	۲/۴	-/۱	۲۷/۴	۱۷/۱۹	۶/۹
۱۳۹۷	۲/۱	-/۴	۲۳/۰	۱۴/۸۷	۴/۱
۱۳۹۶	۲/۲	-/۵	۲۷/۴	۱۹/۳۳	۷/۹
۱۳۹۷	۱/۳	-/۸	۲۹/۱	۲۰/۸	۵/۰۱
۱۳۹۶	۱/۲	۱/۲	۳۰/۰۱	۲۱/۹	۸/۳
۱۳۹۷	۱/۱	-/۲	۳۲/۶	۲۱/۳	۹/۱
۱۳۹۶	۱/۸	۱/۴	۳۵/۷	۲۰/۹	۹/۳
۱۳۹۷	۱/۹	۱/۹	۳۴/۶	۲۲/۹	۸/۳۳
۱۳۹۶	۲/۰	-/۸	۲۷/۸	۲۱/۰۱	۸/۲۶
۱۳۹۷	۲/۱	۱/۹	۲۷/۳	۲۰/۹	۷/۳۲

اندازه هر کرت ۱۲ مترمربع بود. رقم طارم محلی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. تاریخ‌های نشاکاری در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۵ اردیبهشت و ۱۲ اردیبهشت ماه بود. سن نشا در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۰ و ۲۸ روز بود. فاصله کاشت در هر دو سال ۲۵×۲۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. جهت جلوگیری از تداخل آب و کودهای مصرفی بر روی مرزهای کرت‌ها از پوشش نایلونی استفاده گردید. برای مبارزه با علف‌های هرز از وجین دستی و علف‌کش بوتاکلر استفاده شد و عملیات داشت طبق الگوی معمول منطقه انجام شد. در طول مرحله رشد گیاه تاریخ‌های بذرپاشی، نشاکاری، شروع خوشه‌دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی ثبت گردید. جهت برآورد مقدار زیست‌توده، یک مترمربع از هر کرت پس از رسیدگی با در نظر گرفتن اثر حاشیه‌ای کف‌بر و به مدت ۴۸ ساعت در درجه حرارت ۷۲ درجه سانتی‌گراد آون قرار داده شد و سپس مورد توزین قرار گرفت. برای تعیین نیتروژن دانه و نیتروژن کل اندام هوایی (برگ، ساقه و دانه) از بافت موردنظر مقداری انتخاب گردید (در مرحله رسیدگی) و سپس در آون به مدت ۷۲ ساعت در دمای ۷۰ درجه سلسیوس خشک گردید و بعد از آسیاب یک گرم از نمونه آسیاب شده انتخاب و پس از رقیق کردن، عصاره‌ای از آن تهیه شده و غلظت نیتروژن به روش میکروکج‌لدال حاصل شد. جهت بررسی شاخص سطح برگ، تعداد چهار بوته از هر کرت (با حذف اثر حاشیه‌ای) در آغاز مرحله زایشی کف‌بر و با جداسازی برگ‌ها و قرار دادن آن‌ها در دستگاه تعیین سطح برگ (LI-COR-Lincoln, NB, USA) میزان آن تعیین گردید. برای تعیین عملکرد پس از حذف حاشیه، ۵۰ کپه از هر کرت انتخاب و پس از برداشت خرمن‌کوبی شده، سپس توزین و عملکرد کیلوگرم در هکتار برحسب رطوبت ۱۴ درصد محاسبه گردید.

### ۳.۱. مدل ORYZA2000

مدل ORYZA2000 یک مدل فیزیولوژیکی است که رشد و نمو برنج را تحت شرایط تولید بالقوه، محدودیت آب و محدودیت نیتروژن شبیه‌سازی می‌کند (بومن<sup>۱</sup> و همکاران، ۲۰۰۱). شرایط مساعد نور، دما و ویژگی‌های وارپته‌ای برای فرآیندهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی جز عوامل اصلی تعیین‌کننده سرعت رشد یک محصول هستند. مدل ORYZA2000 از یک طرح محاسباتی روزانه برای میزان تولید ماده خشک اندام‌های گیاهی پیروی می‌کند. داده‌های حاصل در طول زمان تولید ماده خشک و مراحل رشد شبیه‌سازی می‌شود. این مدل افزایش ماده خشک روزانه در اندام‌های گیاه و روند توسعه آن را شبیه‌سازی می‌کند.

بر اساس ویژگی‌های فتوسنتزی هر برگ (تک‌برگ) نرخ لحظه‌ای جذب CO<sub>2</sub> در سه زمان در طول روز و در سه عمق کانوپی گیاه محاسبه می‌شود. نرخ خالص رشد روزانه با کسر میزان تنفس رشد به دست می‌آید. هنگامی که کانوپی هنوز به‌طور کامل بسته نشده است سطح برگ به‌صورت نمای به‌عنوان تابعی از دما رشد می‌نماید. تعداد خوشچه در هنگام گلدهی از زیست‌توده انباشته‌شده بین شروع گلدهی و خوشه‌دهی حاصل می‌گردد. پتانسیل نیاز روزانه نیتروژن از وزن خشک، سرعت رشد و غلظت نیتروژن هر اندام گیاه محاسبه می‌شود. فرض مدل بر این مبنا است که محصول تلاش می‌کند تا حداکثر غلظت نیتروژن را در برگ و ساقه حفظ نماید.

نیاز اندام‌های رویشی به نیتروژن از طریق جذب نیتروژن گیاه برآورده می‌شود که توسط سرعت جذب گیاه و مقدار موجود نیتروژن در خاک محدود می‌شود. نیاز خوشه به نیتروژن از طریق انتقال این عنصر از اندام‌های رویشی برآورد می‌شود و باید به این نکته نیز اشاره داشت که در این مدل مراحل تغییرات بیوشیمیایی نیتروژن شبیه‌سازی نمی‌شود.

<sup>1</sup> Bouman

به‌طور کلی در مورد ORYZA2000 دوره رشد و نمو برنج بر اساس درجه حرارت روزرشد به چهار مرحله فنولوژی شامل دوره رشد رویشی پایه، دوره رشد حساس به نور، دوره تشکیل خوشه و دوره پر شدن دانه تقسیم‌بندی می‌شود.

### ۲.۳. کالیبراسیون مدل

پارامتر مدل ORYZA2000 برای رقم طارمی محلی بر اساس روش بومن<sup>۱</sup> و ون لار<sup>۲</sup> (۲۰۰۶) مورد ارزیابی قرار گرفت. مراحل نمو با استفاده از تاریخ‌های سبز شدن، شروع خوشه، گلدهی، رسیدگی فیزیولوژیکی و درجه حرارت هوا در سال اول آزمایش محاسبه گردید. سطح ویژه برگ با مقدار مشاهده‌شده شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ محاسبه شد (بولینگ<sup>۳</sup> و همکاران، ۲۰۰۷). فاکتورهای تخصیص ماده خشک در ابتدا توسط محاسبه زیست‌توده برگ‌ها، ساقه و خوشه‌ها در مرحله رسیدگی اندازه‌گیری و در ادامه مقدار اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی شده شاخص سطح برگ در انتهای مرحله رویشی و زیست‌توده گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از یافته‌های بومن<sup>۴</sup> و ون لار<sup>۵</sup> (۲۰۰۶) و لی<sup>۶</sup> و همکاران (۲۰۰۹)، جهت برآورد پارامترهای سرعت توسعه فنولوژیکی، فاکتورهای تفکیک ماده خشک، سرعت رشد نسبی سطح برگ، سطح ویژه برگ، سرعت زوال برگ و کسر ذخیره ساقه از برنامه DRATES مدل استفاده گردید که نتیجه آن محاسبه مقادیر سرعت توسعه فنولوژیکی در چهار فاز بود. بعد از اجرای برنامه DRATES برنامه PARAM اجرا و سایر پارامترهای مورد نظر از قبیل سرعت رشد نسبی سطح برگ (RGRLMX)، کسر ذخیره ساقه (FSTR)، سرعت مرگ برگ در طول دوره رشد ( $(DAY)^{-1}$ , DRLVT)، سطح ویژه برگ در طول دوره رویش (SLA, ha/kg) و فاکتور تفکیک ماده خشک بین برگ (FLV)، ساقه (FST) و خوشه (FSO) در طول دوره رویش به‌وسیله آن محاسبه گردید.

### ۳.۳. ارزیابی مدل

مقایسه مقدار شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده برای هر تیمار با تعیین ضریب تبیین ( $R^2$ ) و خط ۱:۱ انجام گردید. جهت ارزیابی آماری نتایج شبیه‌سازی از آزمون  $P(t)$  و پارامتر آماری زیر استفاده شد.

$$RMSE = \left( \sum_{i=1}^n (P_i - O_i)^2 / n \right)^{0.5} \quad \text{رابطه ۱) ریشه میانگین مربعات خطا}$$

$$RMSE_n = 100 \left( \sum_{i=1}^n (P_i - O_i)^2 / n \right)^{0.5} / \bar{O} \quad \text{رابطه ۲) ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده}$$

که در این روابط  $P_i$  برابر با مقدار پیش‌بینی شده،  $O_i$  نشان‌دهنده مقدار اندازه‌گیری شده (مشاهده‌شده)،  $n$  نشان‌دهنده تعداد نمونه‌های به‌کاررفته و  $\bar{O}$  میانگین مقادیر اندازه‌گیری شده بود. مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطاهای نرمال شده در حالت مطلوب یعنی حالتی که مقدار شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده مساوی باشد برابر صفر است. چنانچه مقدار نتیجه آزمون  $t$  بیشتر از ۰/۰۵ باشد بدان مفهوم است که مقادیر شبیه‌سازی پارامتر در سطح ۹۵

<sup>1</sup> Bouman

<sup>2</sup> Van Laar

<sup>3</sup> Boling

<sup>4</sup> Bouman

<sup>5</sup> Van Laar

<sup>6</sup> Lee

درصد اختلاف معنی‌داری با مقدار اندازه‌گیری شده ندارد. چنانچه مقدار میانگین مربعات خطای نرمال شده کمتر از ۱۰، بین ۲۰-۱۰، بین ۳۰-۲۰ و بیشتر از ۳۰ باشد به ترتیب نشان‌دهنده حالت عالی، خوب، متوسط و ضعیف شبیه‌سازی می‌باشد (امیری<sup>۱</sup> و همکاران، ۲۰۱۴).

## ۴. یافته‌های پژوهش

### ۴.۱. شاخص سطح برگ

نتایج حاصل از شبیه‌سازی شاخص سطح برگ با استفاده از مدل ORYZA2000 نشان داد که ریشه میانگین مربعات خطا در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل به ترتیب برابر با ۰/۵ و ۰/۴ بود. همچنین ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل تحت شرایط مقادیر و تقسیم مختلف کود نیتروژن به ترتیب برابر ۱۶ و ۱۰ بود (جدول ۳). نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون خطی بین مقادیر شاخص سطح برگ شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده نشان داد که ضریب تبیین ( $R^2$ ) برای داده‌های کالیبراسیون مدل برابر ۰/۵۸ و برای داده‌های اعتبارسنجی مدل برابر ۰/۵ بود (جدول ۳). دامنه تغییرات شاخص سطح برگ بین مقادیر مشاهده‌شده در کالیبراسیون مدل بین ۳/۱۲ الی ۵/۱ بود درحالی‌که دامنه تغییرات این شاخص بین مقادیر شبیه‌سازی شده در کالیبراسیون مدل بین ۲/۷ الی ۴/۹۴ بود (جدول ۴).

جدول ۳. نتایج حاصل از واسنجی و اعتبارسنجی داده‌ها با استفاده از مدل ORYZA2000 در مدیریت مختلف مصرف نیتروژن.

صفات	تعداد نمونه	O <sub>mean</sub>	P <sub>mean</sub>	R <sup>2</sup>	P(t)	RMSE	RMSE <sub>n</sub> (%)
نیتروژن دانه	۱۷	۹۹	۹۸	۰/۷۸	۰/۴۸	۱۰	۹
نیتروژن کل اندام هوایی (برگ، ساقه و دانه)	۱۷	۱۳۳	۱۳۴	۰/۹۰	۰/۴۱	۹	۶
شاخص سطح برگ	۱۷	۴	۳	۰/۵۸	۰/۰۴	۰/۵	۱۶
زیست‌توده	۱۷	۱۳۵۶۴	۱۳۳۹۹	۰/۸۴	۰/۴۳	۶۴۶	۴
عملکرد دانه	۱۷	۶۴۷۵	۶۷۳۹	۰/۷۹	۰/۱۴	۴۰۳	۴
نیتروژن دانه	۱۷	۱۰۲	۱۰۱	۰/۸۲	۰/۳۸	۵	۴
نیتروژن کل اندام هوایی (برگ، ساقه و دانه)	۱۷	۱۳۶	۱۳۸	۰/۸۶	۰/۱۳	۱	۸
شاخص سطح برگ	۱۷	۱۳۹	۱۳۳	۰/۵۰	۰/۴۰	۰/۴	۱۰
زیست‌توده	۱۷	۱۴۱۱۱	۱۳۶۷۹	۰/۸۵	۰/۲۶	۸۸۳	۴
عملکرد دانه	۱۷	۶۷۵۱	۶۸۹۷	۰/۸۱	۰/۲۹	۴۱۴	۵

RMSE<sub>n</sub> = ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده، RMSE = ریشه میانگین مربعات خطا، P(t): آزمون t، P<sub>mean</sub>: میانگین مقادیر پیش بینی شده، O<sub>mean</sub> = میانگین مقادیر اندازه‌گیری شده

جدول ۴. نتایج حاصل از مقادیر شاخص سطح برگ شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل


اعتبارسنجی (۱۳۹۷)			کالیبراسیون (۱۳۹۶)			
مقدار	تقسیم	اندازه‌گیری شده	شبیه‌سازی شده	خطای مدل	اندازه‌گیری شده	شبیه‌سازی شده
N <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	۳/۴۲	۲/۸	۳	۳/۳۹	۲/۹۱
N <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	۳/۴۵	۲/۸	۶	۳/۴۲	۲/۷۸
N <sub>1</sub>	T <sub>3</sub>	۳/۱۲	۲/۷	۵	۳/۳۴	۲/۵۶

<sup>1</sup> Amiri



-۷	۳/۵۳	۳/۱۴	۰	۳/۱	۳/۲۱	T <sub>4</sub>	N <sub>1</sub>
-۳	۳/۳۸	۳/۲۴	۱۰	۳	۳/۸۷	T <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>
۵	۳/۳۵	۴/۰۱	۱۰	۳	۴/۱۲	T <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>
-۳	۳/۲۶	۳/۱۲	۱۰	۲/۸۹	۳/۲۵	T <sub>3</sub>	N <sub>2</sub>
۱۱	۳/۷۱	۴/۳۴	۱۹	۳/۲	۴/۱۹	T <sub>4</sub>	N <sub>2</sub>
۱۸	۳/۵۴	۵/۱۴	۲۷	۳/۱۱	۵/۱	T <sub>1</sub>	N <sub>3</sub>
۲۱	۳/۵۲	۵/۱۷	۳۱	۳/۰۹	۵/۰۸	T <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>
۲۰	۳/۴۲	۵/۱۳	۲۱	۳/۰۱	۵/۰۳	T <sub>3</sub>	N <sub>3</sub>
۵	۳/۸۲	۴/۲۷	۶	۳/۲۴	۴/۱۳	T <sub>4</sub>	N <sub>3</sub>
۱	۳/۶۶	۴/۱۹	۹	۳/۲	۴/۱۵	T <sub>1</sub>	N <sub>4</sub>
۴	۳/۶۴	۴/۳۴	۸	۳/۱۹	۴/۵۶	T <sub>2</sub>	N <sub>4</sub>
۳	۳/۵۴	۴/۱۵	۹	۳/۱۱	۴/۸۷	T <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>
-۲	۴/۸۸	۴/۴۵	۱	۴/۹۴	۴/۹۸	T <sub>4</sub>	N <sub>4</sub>

$N_4, N_3, N_2, N_1$ : به ترتیب برابر با مصرف ۵۰، ۹۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از منبع اوره  
 $T_1$ : مصرف به صورت ۷۰ درصد پایه + ۳۰ درصد پنجه زنی،  $T_2$ : مصرف به صورت ۳۳/۳۳ درصد پایه + ۳۳/۳۳ درصد پنجه زنی + ۳۳/۳۳ درصد ظهور خوشه  
 آغازین،  $T_3$ : مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۵۰ درصد پنجه زنی + ۲۵ درصد ظهور خوشه آغازین،  $T_4$ : مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۲۵ درصد پنجه-  
 زنی + ۵۰ درصد ظهور خوشه آغازین




شکل ۱. مقایسه شاخص سطح برگ شبیه سازی شده و اندازه گیری شده شاخص سطح برگ در اعتبارسنجی مدل

میانگین مقادیر مشاهده شده شاخص سطح برگ در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل به ترتیب برابر ۴/۱۶ و ۴/۰۵ بود و میانگین مقادیر شبیه سازی شده در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل به ترتیب به مقدار ۳/۱۵ و ۳/۴۷ حاصل شد (جدول ۳). بیشترین خطا در کالیبراسیون مدل (۳۱) و اعتبارسنجی مدل (۲۱) در تیمار ۱۳۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیم  $T_2$  حاصل گردید (جدول ۴).

#### ۲.۴. شبیه سازی زیست توده

نتایج شبیه سازی زیست توده گیاه برنج در روز برداشت با استفاده از مدل ORYZA2000 نشان داد که مقدار ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در کالیبراسیون مدل به ترتیب ۶۴۶ کیلوگرم در هکتار و ۴ درصد بود در حالی که این مقادیر در اعتبارسنجی مدل به ترتیب برابر ۸۸۳ کیلوگرم در هکتار و ۴ درصد حاصل گردید (جدول ۳). نتایج آزمون t نشان داد که مقادیر زیست توده روز برداشت شبیه سازی شده در سطح ۹۵ درصد اختلاف

معنی‌داری با مقدار اندازه‌گیری شده نداشت. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون خطی بین مقادیر زیست‌توده شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده نشان داد که ضریب تبیین برای داده‌های واسنجی مدل برابر ۰/۸۴ و برای داده‌های اعتبارسنجی مدل برابر ۰/۸۵ بود (جدول ۳). همچنین ضریب تبیین برای مقادیر اندازه‌گیری و شبیه‌سازی شده در سال ۱۳۹۷ به میزان ۰/۷۹ در شبیه‌سازی زیست‌توده حاصل شد (شکل ۲). با توجه به معادله رگرسیون حاصل شده به ازای هر کیلوگرم از زیست‌توده برداشت‌شده معادل ۷۰۰ گرم به مقدار شبیه‌سازی اضافه می‌شود.



شکل ۲. مقایسه زیست‌توده‌ی روز برداشت شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده نسبت به خط ۱:۱ در اعتبارسنجی مدل

جدول شماره ۵ نشان داد که بیشترین مقدار بیوماس روز برداشت محاسبه‌شده در مصرف ۱۳۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیط T<sub>4</sub> به میزان ۱۵۱۲۴ کیلوگرم در هکتار طی کالیبراسیون مدل حاصل گردید. همچنین این صفت بیشترین مقدار خود را در مقادیر مشاهده‌شده در اعتبارسنجی مدل نیز در همین تیمار نشان داد. بیشترین مقدار شبیه‌سازی شده بیوماس روز برداشت در تیمار ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیط T<sub>3</sub> در کالیبراسیون و واسنجی مدل با مقادیر به ترتیب ۱۵۱۵۹ و ۱۶۱۹۳ کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول ۵). بیشترین خطا در کالیبراسیون مدل (-۱۰) در تیمار ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت T<sub>1</sub> حاصل شد درحالی‌که بیشترین خطای مدل در اعتبارسنجی (۱۰) در تیمار ۵۰ کیلوگرم مصرف کود نیتروژن در هکتار به صورت T<sub>2</sub> به دست آمد (جدول ۵).

جدول ۵. نتایج حاصل از زیست‌توده روز برداشت شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل


اعتبارسنجی (۱۳۹۷)			کالیبراسیون (۱۳۹۶)		
مقدار	تقسیمت	اندازه‌گیری شده	شبیه‌سازی شده	خطای مدل	خطای مدل
N <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	۱۱۶۲۰	۱۱۸۷۵	-۱	-۳
N <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	۱۲۵۲۷	۱۱۷۱۳	۷	۱۰
N <sub>1</sub>	T <sub>3</sub>	۱۱۳۱۲	۱۱۷۳۱	-۴	۱
N <sub>1</sub>	T <sub>4</sub>	۱۲۰۱۱	۱۱۶۳۴	۲	۸
N <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	۱۲۰۷۶	۱۳۲۸۶	-۱۰	-۸
N <sub>2</sub>	T <sub>2</sub>	۱۴۰۶۰	۱۳۳۱۷	۵	۷
N <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	۱۳۳۸۳	۱۳۳۳۵	۱	۴
N <sub>2</sub>	T <sub>4</sub>	۱۴۰۴۱	۱۳۳۳۱	۵	۹
N <sub>3</sub>	T <sub>1</sub>	۱۴۲۶۸	۱۴۲۸۱	-۱	۲

۰	۱۴۸۰۹	۱۴۷۵۹	-۱	۱۴۳۶۱	۱۴۱۵۳	T <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>
۶	۱۴۸۶۶	۱۵۷۸۵	۴	۱۴۴۹۷	۱۵۰۴۸	T <sub>3</sub>	N <sub>3</sub>
۷	۱۴۸۴۷	۱۶۰۹۷	۵	۱۴۳۱۴	۱۵۱۲۴	T <sub>4</sub>	N <sub>3</sub>
-۴	۱۵۵۴۱	۱۴۸۵۶	-۳	۱۴۷۷۶	۱۴۳۵۸	T <sub>1</sub>	N <sub>4</sub>
-۲	۱۵۷۲۷	۱۵۳۶۷	-۱	۱۵۱۱۶	۱۴۸۱۲	T <sub>2</sub>	N <sub>4</sub>
-۲	۱۶۱۹۳	۱۵۸۹۴	-۶	۱۵۱۵۹	۱۴۲۷۸	T <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>
-۱	۱۵۶۷۷	۱۵۱۸۴	-۴	۱۵۱۵۳	۱۴۵۷۵	T <sub>4</sub>	N <sub>4</sub>

N<sub>4</sub>, N<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>, N<sub>1</sub>: به ترتیب برابر با مصرف ۵۰، ۹۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از منبع اوره  
T<sub>1</sub>: مصرف به صورت ۷۰ درصد پایه + ۳۰ درصد پنجه زنی، T<sub>2</sub>: مصرف به صورت ۳۳/۳۳ درصد پایه + ۳۳/۳۳ درصد پنجه زنی + ۳۳/۳۳ درصد ظهور خوشه  
آغازین، T<sub>3</sub>: مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۵۰ درصد پنجه زنی + ۲۵ درصد ظهور خوشه آغازین، T<sub>4</sub>: مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۲۵ درصد پنجه-زنی + ۵۰ درصد ظهور خوشه آغازین

### ۳.۴. عملکرد دانه

نتایج شبیه سازی عملکرد به وسیله مدل ORYZA2000 نشان داد که در کالیبراسیون مدل ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده به ترتیب ۴۰۳ کیلوگرم در هکتار و ۴ درصد بود در حالی که مقادیر این فاکتورها در اعتبارسنجی مدل به ترتیب به میزان ۴۱۴ کیلوگرم در هکتار و ۵ درصد حاصل گردید (جدول ۳). نتایج نشان داد که مقادیر شبیه سازی شده عملکرد دانه در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی داری با مقدار اندازه گیری شده نداشت. همچنین تجزیه رگرسیون خطی بین مقادیر عملکرد دانه شبیه سازی شده و اندازه گیری شده طبق داده های دوساله نشان داد که ضریب تبیین (R<sup>2</sup>) برابر با ۰/۸۲ بود که نشان از مناسب بودن مدل در شبیه سازی عملکرد دانه بود (شکل ۳).



شکل ۳. مقایسه عملکرد دانه شبیه سازی شده و اندازه گیری شده نسبت به خط ۱:۱ در اعتبارسنجی

دامنه تغییرات عملکرد در مقادیر مشاهده شده طی کالیبراسیون مدل بین ۵۶۶۷ کیلوگرم در هکتار الی ۷۲۸۴ کیلوگرم در هکتار و در اعتبارسنجی مدل بین ۵۷۲۱ کیلوگرم در هکتار و ۷۹۱۹ کیلوگرم در هکتار بود (جدول ۸). بیشترین مقدار عملکرد شبیه سازی شده در کالیبراسیون مدل (۷۲۷۸ کیلوگرم در هکتار) در مصرف ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیم T<sub>1</sub> حاصل شد و همچنین در همین تیمار کودی نیز بیشترین مقدار عملکرد دانه شبیه سازی شده (۷۸۶۶ کیلوگرم در هکتار) در اعتبارسنجی مدل به دست آمد (جدول ۶).

جدول ۶. نتایج حاصل از عملکرد دانه شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل

اعتبارسنجی (۱۳۹۷)			کالیبراسیون (۱۳۹۶)				
خطای مدل	شبیه‌سازی شده	اندازه‌گیری شده	خطای مدل	شبیه‌سازی شده	اندازه‌گیری شده	تقسیمات	مقدار
-۱	۶۱۰۹	۶۰۹۸	-۴	۶۰۵۹	۵۷۵۳	T <sub>1</sub>	N <sub>1</sub>
۱	۶۰۳۹	۶۱۴۲	-۳	۶۱۱۶	۵۸۷۶	T <sub>2</sub>	N <sub>1</sub>
-۲	۶۱۱۰	۶۰۷۸	-۶	۶۰۶۹	۵۶۶۷	T <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>
۱	۵۵۸۶	۵۷۲۱	-۲	۶۰۰۹	۶۰۰۵	T <sub>4</sub>	N <sub>1</sub>
-۱۰	۷۰۳۸	۶۲۳۱	-۱۵	۷۱۳۶	۶۰۱۷	T <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>
-۱	۷۱۸۶	۶۸۶۶	-۱	۶۷۴۳	۶۶۷۹	T <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>
۳	۷۱۳۶	۷۹۱۹	۰	۶۷۱۷	۶۷۲۸	T <sub>3</sub>	N <sub>2</sub>
۱	۶۷۱۲	۶۸۶۸	۱	۶۵۶۲	۶۶۷۸	T <sub>4</sub>	N <sub>2</sub>
-۱۱	۷۷۹۷	۶۷۳۱	-۹	۷۲۳۹	۶۵۴۴	T <sub>1</sub>	N <sub>3</sub>
-۲	۷۳۷۷	۷۱۷۷	-۴	۷۰۵۶	۶۷۸۸	T <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>
۳	۷۳۵۶	۷۶۳۹	۱	۷۱۲۷	۷۲۸۴	T <sub>3</sub>	N <sub>3</sub>
۶	۷۱۱۴	۷۶۴۴	۳	۷۰۹۳	۷۲۴۵	T <sub>4</sub>	N <sub>3</sub>
-۴	۷۸۶۶	۷۵۹۴	-۸	۷۲۷۸	۶۶۷۸	T <sub>1</sub>	N <sub>4</sub>
-۶	۷۶۵۳	۷۲۷۷	-۴	۷۲۴۹	۷۰۱۶	T <sub>2</sub>	N <sub>4</sub>
-۴	۷۶۹۷	۷۱۵۷	-۳	۷۱۸۷	۷۰۲۱	T <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>
-۷	۷۳۶۹	۶۸۳۷	-۵	۷۰۹۸	۶۶۴۸	T <sub>4</sub>	N <sub>4</sub>

N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub>, N<sub>4</sub>: به ترتیب برابر با مصرف ۵۰، ۹۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از منبع اوره  
 T<sub>1</sub>: مصرف به صورت ۷۰ درصد پایه + ۳۰ درصد پنجه‌زنی، T<sub>2</sub>: مصرف به صورت ۳۳/۳۳ درصد پایه + ۳۳/۳۳ درصد پنجه‌زنی + ۳۳/۳۳ درصد ظهور خوشه  
 آغازین، T<sub>3</sub>: مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۵۰ درصد پنجه‌زنی + ۲۵ درصد ظهور خوشه آغازین، T<sub>4</sub>: مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۲۵ درصد پنجه-زنی + ۵۰ درصد ظهور خوشه آغازین

دامنه تغییرات عملکرد در مقادیر شبیه‌سازی شده طی کالیبراسیون مدل بین ۶۰۰۹ کیلوگرم در هکتار الی ۷۲۷۸ کیلوگرم در هکتار و در اعتبارسنجی مدل بین ۵۵۸۶ کیلوگرم در هکتار و ۷۸۶۶ کیلوگرم در هکتار بود (جدول ۶). بیشترین درصد خطای مدل در کالیبراسیون مدل (-۱۵ درصد) در تیمار ۹۰ کیلوگرم مصرف کود نیتروژن به صورت T<sub>1</sub> به دست آمد و این در حالی بود که بیشترین درصد خطای مدل در اعتبارسنجی مدل (-۱۱ درصد) در مصرف ۱۳۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیمات کودی T<sub>1</sub> حاصل شد.

#### ۴.۴. شبیه‌سازی نیتروژن کل اندام هوایی (برگ، ساقه و دانه)

در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل ORYZA2000 مقدار ریشه میانگین مربعات خطا در بررسی مقدار نیتروژن کل به ترتیب برابر ۹ و ۱ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در کالیبراسیون مدل برابر ۶ درصد و در اعتبارسنجی مدل برابر ۸ درصد بود (جدول ۳). بیشترین میزان جذب نیتروژن کل گیاه اندازه‌گیری شده (۱۷۳ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و شبیه‌سازی شده (۱۷۹ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) در کالیبراسیون مدل در تیمار ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار طی تقسیمات T<sub>4</sub> حاصل گردید درحالی‌که بیشترین مقدار اندازه‌گیری شده (۱۷۲ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و شبیه‌سازی شده (۲۰۱ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) نیتروژن جذب‌شده در گیاه در


اعتبارسنجی مدل به ترتیب در تیمار مصرف ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به صورت تقسیط T<sub>4</sub> و تیمار مصرف ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در تقسیط T<sub>3</sub> به دست آمد (جدول ۷).

جدول ۷. نتایج حاصل از مقادیر نیتروژن کل اندام هوایی شبیه سازی و اندازه گیری شده در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل

اعتبارسنجی (۱۳۹۷)			کالیبراسیون (۱۳۹۶)			
خطای مدل	شبیه سازی شده	اندازه گیری شده	خطای مدل	شبیه سازی شده	اندازه گیری شده	تقسیمات
-۴	۹۵	۹۳	-۳	۹۳	۹۰	T <sub>1</sub> N <sub>1</sub>
۰	۹۷	۹۸	۳	۹۶	۹۸	T <sub>2</sub> N <sub>1</sub>
۰	۹۹	۹۹	۱	۹۸	۹۸	T <sub>3</sub> N <sub>1</sub>
۲	۹۸	۱۰۲	۳	۹۹	۱۰۲	T <sub>4</sub> N <sub>1</sub>
۱۸	۱۱۸	۱۴۴	۱۴	۱۱۷	۱۳۶	T <sub>1</sub> N <sub>2</sub>
۹	۱۲۵	۱۳۷	۱	۱۲۴	۱۲۳	T <sub>2</sub> N <sub>2</sub>
۹	۱۲۶	۱۴۱	۸	۱۲۵	۱۳۷	T <sub>3</sub> N <sub>2</sub>
۱۱	۱۲۴	۱۳۹	۳	۱۲۶	۱۳۰	T <sub>4</sub> N <sub>2</sub>
-۳	۱۴۱	۱۳۷	۱	۱۳۹	۱۴۱	T <sub>1</sub> N <sub>3</sub>
-۹	۱۵۱	۱۳۶	-۱۱	۱۴۸	۱۳۴	T <sub>2</sub> N <sub>3</sub>
۰	۱۵۴	۱۵۳	۰	۱۴۹	۱۴۸	T <sub>3</sub> N <sub>3</sub>
۰	۱۵۵	۱۵۵	-۴	۱۵۳	۱۴۷	T <sub>4</sub> N <sub>3</sub>
-۶	۱۶۴	۱۵۴	۰	۱۶۰	۱۶۰	T <sub>1</sub> N <sub>4</sub>
-۱۰	۱۷۴	۱۵۲	-۱۱	۱۷۱	۱۵۳	T <sub>2</sub> N <sub>4</sub>
-۱۶	۲۰۱	۱۷۱	-۶	۱۷۵	۱۶۴	T <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
-۶	۱۸۱	۱۷۲	-۳	۱۷۹	۱۷۳	T <sub>4</sub> N <sub>4</sub>

N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub>, N<sub>4</sub>: به ترتیب برابر با مصرف ۵۰، ۹۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از منبع اوره  
 T<sub>1</sub>: مصرف به صورت ۷۰ درصد پایه + ۳۰ درصد پنجه زنی، T<sub>2</sub>: مصرف به صورت ۳۳/۳۳ درصد پایه + ۳۳/۳۳ درصد پنجه زنی + ۳۳/۳۳ درصد ظهور خوشه  
 آغازین، T<sub>3</sub>: مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۵۰ درصد پنجه زنی + ۲۵ درصد ظهور خوشه آغازین، T<sub>4</sub>: مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۲۵ درصد پنجه  
 زنی + ۵۰ درصد ظهور خوشه آغازین

نتایج آزمون t نشان داده است که مقدار نیتروژن کل اندام هوایی شبیه سازی شده در مدیریت های مختلف مقدار و تقسیط کود نیتروژن با مقدار بیش از ۰/۰۵ در سطح اطمینان ۹۵ درصد اختلاف معنی داری با مقدار اندازه گیری شده نداشت. ضریب تبیین مدل برای داده های واسنجی مدل برابر ۰/۹۰ و برای داده های اعتبارسنجی مدل برابر ۰/۸۶ بوده که بالا بودن نسبی R<sup>2</sup> بیانگر پراکندگی پائین داده ها بود (جدول ۳). ضریب تبیین مدل برای داده های اندازه گیری و شبیه سازی شده در سال ۱۳۹۷ برابر با ۰/۷۶ بود (شکل ۴).




شکل ۴. مقایسه جذب کل نیتروژن کل شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده و اندازه‌گیری شده نسبت به خط ۱:۱ در اعتبارسنجی مدل

کمترین مقدار اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی شده نیتروژن جذب شده در کالیبراسیون و واسنجی مدل در تیمار مصرف ۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیم  $T_1$  حاصل شد (جدول ۷). بیشترین خطای مدل در مقدار مصرف ۹۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیم  $T_1$  در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل به دست آمد (جدول ۷).

#### ۵.۴. شبیه‌سازی نیتروژن دانه

نتایج حاصل از شبیه‌سازی نیتروژن دانه با استفاده از مدل ORYZA2000 نشان داد که ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در کالیبراسیون مدل به ترتیب ۱۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و ۹ درصد بود درحالی‌که در اعتبارسنجی مدل مقدار ریشه میانگین مربعات خطا ۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و مقدار ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده ۴ درصد بود (جدول ۳). نتایج آزمون  $t$  نشان داد که مقادیر نیتروژن دانه شبیه‌سازی شده در مدیریت مختلف کود نیتروژن در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی‌داری با مقدار اندازه‌گیری شده ندارد. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون خطی بین مقادیر نیتروژن دانه شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده نشان داد که ضریب تبیین ( $R^2$ ) برای داده‌های کالیبراسیون مدل برابر با ۰/۷۸ و برای داده‌های اعتبارسنجی مدل برابر با ۰/۸۲ بود (جدول ۳).



شکل ۵. مقایسه جذب کل نیتروژن دانه شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده نسبت به خط ۱:۱ در اعتبارسنجی مدل

دامنه مقادیر مشاهده شده در میزان نیتروژن دانه در کالیبراسیون مدل (۱۳۹۶) بین ۷۳ و ۱۱۷ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در حالی که دامنه تغییرات این صفت در اعتبارسنجی مدل (۱۳۹۷) بین ۷۳ و ۱۱۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود (جدول ۸). در کالیبراسیون مدل بیشترین خطای مدل (۲۲-) در تیمار مصرف ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به صورت تقسیط  $T_1$  حاصل گردید (جدول ۸). بیشترین مقدار نیتروژن دانه شبیه سازی شده در کالیبراسیون مدل در تیمار مصرف ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به صورت مصرف سطح تقسیط  $T_2$  به دست آمد (جدول ۸).

جدول ۸. نتایج حاصل از مقادیر نیتروژن دانه شبیه سازی و اندازه گیری شده در کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل

اعتبارسنجی (۱۳۹۷)			کالیبراسیون (۱۳۹۶)				
خطای مدل	شبیه سازی شده	اندازه گیری شده	خطای مدل	شبیه سازی شده	اندازه گیری شده	تقسیمات	مقدار
-۲۵	۷۳	۵۸	-۳	۷۳	۷۱	$T_1$	$N_1$
۴	۷۹	۸۰	-۱۹	۷۵	۶۳	$T_2$	$N_1$
-۱۰	۷۹	۷۲	-۲۰	۷۶	۶۴	$T_3$	$N_1$
۸	۷۸	۸۴	۲	۷۸	۷۹	$T_4$	$N_1$
۵	۹۵	۱۰۱	۲	۹۵	۹۷	$T_1$	$N_2$
۳	۱۰۰	۱۰۳	۴	۹۶	۱۰۱	$T_2$	$N_2$
-۳	۱۰۰	۹۷	۶	۹۸	۱۰۲	$T_3$	$N_2$
۵	۹۸	۱۰۴	۹	۱۰۲	۱۰۵	$T_4$	$N_2$
۴	۱۱۴	۱۱۸	۰	۱۰۲	۱۰۶	$T_1$	$N_3$
۳	۱۱۴	۱۱۷	۹	۱۱۶	۱۱۹	$T_2$	$N_3$
-۲	۱۱۳	۱۱۱	۱۲	۹۳	۹۶	$T_3$	$N_3$
۴	۱۰۹	۱۱۲	۲	۱۰۹	۱۱۲	$T_4$	$N_3$
۲	۱۱۸	۱۲۱	-۲۲	۱۰۹	۹۴	$T_1$	$N_4$
۲	۱۱۷	۱۱۸	۸	۱۱۷	۱۲۸	$T_2$	$N_4$
-۲	۱۱۶	۱۱۳	۴	۱۱۶	۱۲۲	$T_3$	$N_4$
۰	۱۱۱	۱۱۱	۸	۱۱۳	۱۲۴	$T_4$	$N_4$

$N_1, N_2, N_3, N_4$ : به ترتیب برابر با مصرف ۵۰، ۹۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از منبع اوره  
 $T_1$ : مصرف به صورت ۷۰ درصد پایه + ۳۰ درصد پنجه زنی،  $T_2$ : مصرف به صورت ۳۳/۳۳ درصد پایه + ۳۳/۳۳ درصد پنجه زنی + ۳۳/۳۳ درصد ظهور خوشه  
 آغازین،  $T_3$ : مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۵۰ درصد پنجه زنی + ۲۵ درصد ظهور خوشه آغازین،  $T_4$ : مصرف به صورت ۲۵ درصد پایه + ۲۵ درصد پنجه زنی + ۵۰ درصد ظهور خوشه آغازین

کمترین مقدار نیتروژن شبیه سازی شده در کالیبراسیون مدل در تیمار مصرف ۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیط  $T_1$  حاصل شد. در تیمار ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به صورت مصرف در سطح تقسیط  $T_1$  بیشترین مقدار نیتروژن دانه شبیه سازی شده و در تیمار ۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به صورت  $T_1$  کمترین مقدار نیتروژن دانه شبیه سازی شده در اعتبارسنجی مدل به دست آمد (جدول ۸). بیشترین خطای مدل در اعتبارسنجی مدل (۲۵-) در تیمار ۵۰ کیلوگرم مصرف کود نیتروژن در سطح تقسیط  $T_1$  حاصل شد (جدول ۸).

## ۵. بحث

با توجه به یافته های شبیه سازی مدل، بیشترین مقدار شاخص سطح برگ در داده های مشاهده شده طی اعتبارسنجی مدل در تیمار مصرف ۱۳۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به صورت سطح تقسیط  $T_2$  به مقدار ۵/۱۷ حاصل شد

درحالی که این فاکتور در داده‌های شبیه سازی شده طی اعتبارسنجی مدل به میزان ۴/۸۸ در تیمار ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سطح تقسیم T<sub>4</sub> به دست آمد علت این مورد را می توان به میانگین پائین خطای مدل در تیمار مصرف ۱۷۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار نسبت به تیمار مصرف ۱۳۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار طی اعتبارسنجی مدل مرتبط دانست. نتایج نشان دهنده آن است که دقت مدل در برآورد شبیه‌سازی حداکثر شاخص سطح برگ به میزان برآورد شبیه‌سازی دیگر فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق نمی‌باشد که نتایج حاصل‌شده با یافته‌های آذرپور<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۱۴) و ساندهاراجان<sup>۲</sup> و سادھیر<sup>۳</sup> (۲۰۱۳) در زمینه توانایی ضعیف مدل ORYZA2000 جهت شبیه‌سازی شاخص سطح برگ مطابقت داشت. طایفه<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۱۳) نشان داد که مدل، شاخص سطح برگ را بیشتر از مقدار اندازه‌گیری شده در تیمارهای مختلف مصرف نیتروژن شبیه‌سازی نمود. مقدار پایین مصرف کود نیتروژن منجر به کاهش سطح ویژه و کاهش سطح برگ می‌شود و با توجه به ضریب ثابت سطح ویژه برگ به‌کارگیری شده در مدل ORYZA2000 قابلیت شبیه‌سازی شاخص سطح برگ پایین بود که در یافته‌های سایلاجا<sup>۵</sup> و همکاران (۲۰۱۳) نیز بیان شد که در مقادیر کم مصرف نیتروژن مدل ORYZA2000 شاخص سطح برگ را به‌خوبی عملکرد شبیه‌سازی نمود و مقادیر شبیه‌سازی‌شده در سطح احتمال ۹۵ درصد اختلاف معنی‌داری با مقدار اندازه‌گیری شده داشت.

ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده بیوماس روز برداشت در مطالعات صورت پذیرفته در زمینه کارایی شبیه‌سازی مدل ORYZA2000 توسط طایفه<sup>۶</sup> و همکاران (۲۰۱۳) به ترتیب ۷۸۲ کیلوگرم در هکتار و ۱۰/۱ درصد بود که نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق شبیه‌سازی صفت بیوماس روز برداشت توسط مدل را با دقت بهتری صورت داد. ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در تحقیقات بررسی مدل ORYZA2000 توسط ویکارمپراهارن<sup>۷</sup> و کوسیتساکولچای<sup>۸</sup> (۲۰۱۰) و لیمودهی<sup>۹</sup> و همکاران (۲۰۱۴) به ترتیب ۸/۶۸ و ۱۲ درصد به دست آمد. تفاوت بین مقادیر شبیه‌سازی‌شده و اندازه‌گیری شده بیوماس روز برداشت در تیمارهای مختلف نیتروژن نشان داد که مدل به‌خوبی توانست این صفت را شبیه‌سازی کند که نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات ابراهیمی راد<sup>۱۰</sup> و همکاران (۱۳۹۸) مطابقت داشت. تفاوت بین مقادیر شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده عملکرد دانه و همچنین درصد خطای نسبی مدل ORYZA2000 را در تیمارهای مختلف نیتروژن طی دو سال زراعی نشان داد که مدل به‌خوبی عملکرد را شبیه‌سازی نمود که نتایج حاصله با تحقیقات آذرپور<sup>۱۱</sup> و همکاران (۲۰۱۴) و گالریو<sup>۱۲</sup> و ملینتسکو<sup>۱۳</sup> (۲۰۱۴) در زمینه بررسی توانمندی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی صفات زراعی و عملکرد گیاه برنج مطابقت داشت. امیری لاریجانی<sup>۱۴</sup> و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقات خود بر روی کارایی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی خصوصیات فنولوژیکی برنج، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده را در کالیبراسیون و اعتبارسنجی

<sup>1</sup> Azarpour

<sup>2</sup> Soundharajan

<sup>3</sup> Sudheer

<sup>4</sup> Tayefe

<sup>5</sup> Sailaja

<sup>6</sup> Tayefe

<sup>7</sup> Wikarmpapraharn

<sup>8</sup> Kositsakulchai

<sup>9</sup> Limoudehi

<sup>10</sup> Ebrahimirad

<sup>11</sup> Azarpour

<sup>12</sup> Galeriu

<sup>13</sup> Melintescu

<sup>14</sup> Amiri Larijani



مدل به میزان ۱۲ و ۱۶ درصد برآورد نمودند که از دقت کمتری نسبت به تحقیق حاضر برخوردار بود. در تحقیقات لی<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۱۳) دقت بسیار بالایی در شبیه‌سازی عملکرد دانه گردید که نشان از توانمندی بالای مدل در شبیه‌سازی عملکرد در محیط‌های مختلف رشد بود.

نتایج به‌دست‌آمده در برآورد صفت نیتروژن اندام هوایی در این تحقیق نشان‌دهنده شبیه‌سازی مطلوب مدل ORYZA2000 بین مقادیر اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی بود که با نتایج به‌دست‌آمده توسط طایفه<sup>۲</sup> (۲۰۱۳) و لیمودهی<sup>۳</sup> و همکاران (۲۰۱۴) مطابقت داشت. با توجه به مقادیر به‌دست‌آمده ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در این آزمایش، نتایج شبیه‌سازی نیتروژن کل جذب شده با دقت بیشتری نسبت به تحقیق آرتاچو<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۱۱) برآورد گردید. تفاوت بین مقادیر شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده نیتروژن کل اندام هوایی و همچنین درصد خطای نسبی در تیمارهای مختلف نیتروژن نشان داد که مدل به‌خوبی این صفت را شبیه‌سازی نمود.

بالا بودن خطای مدل در برخی از تیمارهای با مصرف مقادیر پایین نیتروژن نشان‌دهنده عدم تعیین دقیق پارامترهای مدل در ارتباط بین خاک و شرایط محیطی در این مقادیر مصرف بود به‌گونه‌ای که پارامترهای مدل برای صحت نتایج شبیه‌سازی در مقادیر بالاتر مصرف نیتروژن به طرز دقیق‌تری برآورد را صورت داده و اندازه‌گیری‌های مرتبط به ورودی داده‌ها با دقت و صحت بالا انجام شد. میانگین ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در تحقیقات برآورد مدل ORYZA2000 توسط طایفه<sup>۵</sup> (۲۰۱۳) به میزان ۱۵ درصد، تاری<sup>۶</sup> و همکاران (۲۰۱۷) به میزان ۱۱ درصد و آرتاچو<sup>۷</sup> و همکاران (۲۰۱۱) به میزان ۳۸ درصد به دست آمد که در نتایج حاصل‌شده این تحقیق، صفت نیتروژن دانه به‌گونه مطلوب‌تری در مدیریت مختلف کود نیتروژن توسط مدل شبیه‌سازی شد. جدول (۴) تفاوت بین مقادیر شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده نیتروژن دانه در تیمارهای مختلف مدیریت نیتروژن را نشان داده و بیانگر آن است که مدل توانسته به‌طور مناسبی آن را شبیه‌سازی کند.

## ۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که مدل ORYZA2000 برای شبیه‌سازی عملکرد دانه، جذب نیتروژن گیاه برنج و مقدار زیست‌توده در رقم طارم محلی تحت مدیریت مختلف کود نیتروژن با ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده کمتر از ۱۲ درصد در استان مازندران از دقت قابل قبولی برخوردار است. مهم‌ترین عامل برای پشتیبانی از دقت کالیبراسیون مدل، اندازه‌گیری و مشاهده دقیق ویژگی‌های خاص یک محصول در مزرعه است. ارزیابی شبیه‌سازی مدل در این تحقیق تایید نمود که عملکرد بالقوه در منطقه مازندران در زمینه رقم مورد مطالعه می‌تواند به حدود ۷۹۰۰ کیلوگرم در هکتار برسد که از طریق بهبود شیوه‌های مدیریت زراعی، زمینه برای افزایش عملکرد وجود دارد. هیچ معیار مطلق برای تشخیص کیفیت مدل وجود ندارد. با این حال انجام آزمایش‌های مقایسه‌ای مکرر بین مقادیر شبیه‌سازی شده توسط مدل و اندازه‌گیری شده تجربی، اطمینان به مناسب بودن یک مدل برای یک هدف خاص را افزایش می‌دهد. با توجه به نتایج

<sup>1</sup> Li

<sup>2</sup> Tayefe

<sup>3</sup> Limoudehi

<sup>4</sup> Artacho

<sup>5</sup> Tayefe

<sup>6</sup> Tari

<sup>7</sup> Artacho

این تحقیق، مدل ORYZA2000 می‌تواند با توجه به شرایط منطقه برنج‌خیز شمال برای پشتیبانی ارزیابی شیوه‌های مدیریت کود نیتروژن مورد استفاده قرار گیرد. هرچند برای دستیابی به نتایج کامل و ایجاد مدل عملی برای ارقام برنج در مدیریت مختلف کود نیتروژن آزمایش‌های طولانی‌مدت در زمینه میزان و نحوه مصرف کود نیتروژن در شالیزارهای مازندران مورد نیاز است.

## ۷. تشکر و قدردانی

از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ... آملی بابت حمایت و همکاری در اجرای رساله، تشکر و قدردانی می‌گردد.

## ۸. تعارض منافع

هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

## ۹. منابع

ابراهیمی راد، حسن؛ بابازاده، حسین، امیری، ابراهیم و صدقی، حسین (۱۳۹۸) ارزیابی بیلان و بهره‌وری آب برنج تحت مدیریت‌های آبیاری و تراکم کاشت با استفاده از مدل‌های Ceres-Rice و ORYZA2000. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. ۱۳(۱)، ۱۶۵-۱۷۶.

### References

- Agricultural Ministry. (2022). *Report of Agricultural Ministry*. Iran Data Portal. <https://irandataportal.syr.edu/ministry-of-agriculture>.
- Amiri, E., Rezaei, M., Rezaei, E. E., & Bannayan, M. (2014). Evaluation of Ceres-Rice, Aquacrop and Oryza2000 models in simulation of rice yield response to different irrigation and nitrogen management strategies. *Journal of Plant Nutrition*, 37(11), 1749-1769.
- Artacho, P., Meza, F., & Alcalde, J. A. (2011). Evaluation of the Oryza2000 rice growth model under nitrogen-limited conditions in an irrigated Mediterranean environment. *Chilean Journal of Agricultural Research*, 71(1), 23.
- Azarpour, E., Moraditochae, M., & Bozorgi, H. R. (2014). Assessment examine of the modeling ability of ORYZA2000 for rice cultivars in Guilan province (Iran). *Journal of Biodiversity and Environmental Sciences*, 4(2), 195-204.
- Boling, A. A., Bouman, B. A. M., Tuong, T. P., Murty, M. V. R., & Jatmiko, S. Y. (2007). Modelling the effect of groundwater depth on yield-increasing interventions in rainfed lowland rice in Central Java, Indonesia. *Agricultural Systems*, 92(1-3), 115-139.
- Bouman, B. A. M., & Van Laar, H. H. (2006). Description and evaluation of the rice growth model ORYZA2000 under nitrogen-limited conditions. *Agricultural Systems*, 87(3), 249-273.
- Bouman, B. A. M., Kropff, M. J., Tuong, T. P., Wopereis, M. C. S., ten Berge, H. F. M., & Van Laar, H. H. (2001). *ORYZA2000: Modeling Lowland Rice*. Los Banos: International Rice Research Institute.
- Cao, B., Hua, S., Ma, Y., Li, B., & Sun, C. (2017). Evaluation of ORYZA2000 for simulating rice growth of different genotypes at two latitudes. *Agronomy Journal*, 109(6), 2613-2629.
- Ebrahimrad, H., Babazadeh, H., Amiri, E., & Sedghi, H. (2019). Evaluation of water balance and water productivity in rice under water-management and different plant density with use Ceres-Rice and ORYZA2000 models. *Iranian Journal of Irrigation & Drainage*, 13(1), 165-176. (In Persian).

- Galeriu, D., & Melintescu, A. (2014). Carbon-14 dynamics in rice: an extension of the ORYZA2000 model. *Radiation and Environmental Biophysics*, 53(1), 187-202.
- Gutaker, R. M., Groen, S. C., Bellis, E. S., Choi, J. Y., Pires, I. S., Bocinsky, R. K., Slaton, R. A., Wilkins, O., Castillo, C. C., Negrao, S., Oliveira, M. M., Fuller, D. Q., Gueds, J. A., Lasky, J. R & Purugganan, M. D. (2020). Genomic history and ecology of the geographic spread of rice. *Nature Plants*, 6(5), 492-502.
- Iqbal, M., Alom, M. A. M. S. F., & Rana, M. M. (2014). Response of modern and hybrid rice varieties to different levels of nitrogen under rice–rice cropping pattern. *Eco-friendly Agriculture Journal*, 7(10), 105-109.
- Larijani, B. A., Sarvestani, Z. T., Nematzadeh, G. H., Manschadi, A. M., & Amiri, E. (2011). Simulating phenology, growth and yield of transplanted rice at different seedling ages in northern Iran using ORYZA2000. *Rice Science*, 18(4), 321-334.
- Li, T., Raman, A. K., Marcaida III, M., Kumar, A., Angeles, O., & Radanielson, A. M. (2013). Simulation of genotype performances across a larger number of environments for rice breeding using ORYZA2000. *Field Crops Research*, 149, 312-321.
- Limoudehi, M. E., Amiri, E., Rezaei, M., & Hoseini, A. (2014). Rice growth and yield simulation under irrigation and N fertilizer regimes by ORYZA2000 model. *Agrochimica Research*, 58(1s), 30-40.
- Majumder, D., & Das, L. (2018). Simulating the yield attributes of Boro rice under nitrogen and irrigation management at Mohanpur, West Bengal using ORYZA2000. *Journal of Agrometeorology*, 20(1), 72-74.
- Sailaja, B., Voleti, S. R., Subrahmanyam, D., Nathawat, M. S., & Rao, N. H. (2013). Validation of Oryza2000 model under combined nitrogen and water limited situations. *Indian Journal of Plant Physiology*, 18(1), 31-40.
- Soundharajan, B., & Sudheer, K. P. (2013). Sensitivity analysis and auto-calibration of ORYZA2000 using simulation-optimization framework. *Paddy and Water Environment*, 11(1), 59-71.
- Tari, D. B., Amiri, E., & Daneshian, J. (2017). Simulating the impact of nitrogen management on rice yield and nitrogen uptake in irrigated lowland by ORYZA2000 Model. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 48(2), 201-213.
- Tayefe, M. (2013). Calibration and evaluation of ORYZA2000 model under different N options in irrigated rice in Iran. *Journal of Biodivers Environment Science*, 3, 77-82.
- Tayefe, M., Amiri, E., Nasrollahzade, A., & Hashemi, S. A. (2013). Testing the modeling capability of ORYZA2000 under nitrogen limit conditions in Northern Iran. *International Journal of Biosciences (IJB)*, 3(11), 1-7.
- Wikarmpapraharn, C., & Kositsakulchai, E. (2010). Evaluation of ORYZA2000 and CERES-Rice models under potential growth condition in the Central Plain of Thailand. *Thai Journal of Agricultural Science*, 43(1), 17-29.
- Zhang, J., Feng, L., Zou, H., & Li Liu, D. (2015). Using ORYZA2000 to model cold rice yield response to climate change in the Heilongjiang province, China. *The Crop Journal*, 3(4), 317-327.
- Zhao, L., Meng, B., & Feng, X. (2020). Mercury methylation in rice paddy and accumulation in rice plant: A review. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 195, 110462.